

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 160 F - Régisseur Recettes D.H.A.F. - CCP DIJON 35 00 28 0



☎ 80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n°22 - 04 Octobre 1989

COLZA

Altises : vol parfois massif

Maladies : Mildiou présent. Pas d'intervention

CEREALES : Surveiller les pucerons dès la levée !

C O L Z A**STADES**

La plupart des Colzas sont maintenant au stade B4/B6 dans tous les départements. Cependant, certaines parcelles ne sont qu'au stade B2/B3 ou présentent des stades particulièrement hétérogènes.

ALTISES**SITUATION :**

- Dans le courant de la semaine dernière, des captures plus ou moins nombreuses suivant les postes ont été relevées dans le Doubs (Torpes : 43* - Mamirolle : 23*), en Haute Saône (Rioz : 17* - Cugney : 25*) et dans le Sénonais (Fouchères : 48** - Coulours : 23*).

* : captures cumulées le 26/09

** : captures cumulées le 02/10.

Actuellement, peu de dégâts dus aux morsures nous sont signalés ou se révèlent préjudiciables pour les cultures.

En revanche, les toutes premières pontes ont déjà eu lieu et devraient se poursuivre dans les jours à venir.

PRECONISATIONS :

En Haute-Saône, dans le Doubs et le Sénonais :

Il peut être intéressant de limiter les pontes à venir. En conséquence :

* Pour les parcelles n'ayant pas encore été protégées :

- si le stade est inférieur à B4 ou s'il est très hétérogène : intervenez dès que possible avec une pyrèthrinoïde de synthèse.

- si le stade est homogène, supérieur à B4 (4 feuilles vraies étalées) : attendre pour une éventuelle intervention sur les larves.

* Pour les parcelles ayant reçu une protection au semis :

N'intervenir que si vous avez observé des dégâts importants sur colza faibles.

Dans les autres situations :

Il n'est pas utile d'intervenir pour le moment.

P...34

— CHARANCONS DU BOURGEON TERMINAL

Pour le piéger, il est impératif d'installer la cuvette jaune sur le sol et non plus enterrée.

— MOUCHE DU CHOU

Les toutes premières larves ont été observées dans l'Yonne et en Côte d'Or.

Il est trop tard pour intervenir.

— MILDIOU

Observé sur cotylédons et même sur feuilles, il reste sans gravité et n'est pas préjudiciable pour la culture au delà du stade cotylédons.

Dans aucun cas, il n'est nécessaire d'intervenir.

Reconnaissance des symptômes :

Petites tâches jaunâtres, irrégulières, à la face supérieure des feuilles. Reconnaissable à coup sûr lorsqu'un duvet blanc se développe au niveau des tâches à la face inférieure des feuilles.

— PHOMA

Toutes premières tâches dans le Doubs et en Côte d'Or. Pas d'intervention.

C E R E A L E S

La mise en place des semis est en cours. Quelques semis précoces d'orge sont déjà levés voire à 1-2 feuilles.

— PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE DES CEREALES

Après une quasi absence sur maïs au cours de l'été, les populations de *Rhopalosiphum padi* ont très sensiblement progressé ces derniers temps. Leur présence sur repousses de céréales reste modérée.

On assiste aux premières arrivées sur les parcelles levées (localement jusqu'à 20 % de pieds porteurs).

Par ailleurs, des analyses réalisées dans des régions voisines (Centre, Champagne) montrent un pouvoir virulifère très élevé des pucerons. Il convient donc d'être particulièrement vigilant cette année.

Une intervention est à envisager dès que 10 à 20 % des pieds sont porteurs de pucerons. Se reporter au dépliant vert pour le choix du produit.

Rappelons que l'observation des pucerons est facilitée lors d'un après-midi doux et ensoleillé.

— SECHERESSE ET DESHERBAGE

Appliqués par conditions sèches, les herbicides de post-semis prélevée ne pourront généralement être bien localisés dans le sol qu'après le retour de pluies.

Peu de références précises existent concernant l'incidence d'un traitement sur sol sec. Cependant, le risque d'une action irrégulière des produits est à prendre en compte. Ce risque peut être très variable selon de multiples facteurs notamment nature du produit, mode de pénétration, finesse du sol en surface ...

Suivant les situations par rapport aux pluies reçues, à l'humidité du sol et aux possibilités de portance après l'arrivée de pluies, il peut être préférable de changer la stratégie de désherbage pour intervenir, par exemple, en post levée à 3 feuilles dans de meilleures conditions.